

がん種	非小細胞肺がん		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	CDDP+GEM		点滴投与時間	day1 4h15m, day8 50m
1コース期間	21days		休薬期間	day9-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>day1</b>		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
②	ゲムシタビン( 1000mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
③	アスパラギン酸K注 10mEq + 硫酸Mg補正液 8mL + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
④	マンニトールS 300mL	点滴静注	30分
⑤	ランダ( 80mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 500mL(全量500mL)	点滴静注	1時間
⑥	アスパラギン酸K注 10mEq + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
	<b>day2.3</b>		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	<b>day4</b>		
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	<b>day8</b>		
①	デキサート 6.6mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	ゲムシタビン( 1000mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ