

がん種	小細胞肺がん		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	CDDP+CPT-11		点滴投与時間	day1 5h15m, day8.15 1h50m
1コース期間	28days		休業期間	day16-28

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
②	イリノテカン(60mg/m ²) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	1.5時間
③	アスパラギン酸K注 10mEq + 硫酸Mg補正液 8mL + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
④	マンニトールS 300mL	点滴静注	30分
⑤	ランダ(60mg/m ²) + 生食 500mL(全量500mL)	点滴静注	1時間
⑥	アスパラギン酸K注 10mEq + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day4		
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day8.15		
①	デキサート 9.9mg + グラニセトロンバッグ	点滴静注	15分
②	イリノテカン(60mg/m ²) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	1.5時間
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ