

|        |         |  |        |            |
|--------|---------|--|--------|------------|
| がん種    | 乳がん     |  | 催吐リスク  | 高度(催吐性)リスク |
| レジメン名  | FEC     |  | 点滴投与時間 |            |
| 1コース期間 | 21 days |  | 休薬期間   | day2-21    |

| 処方No. | 薬品名・用量  | 投与方法 | 注入時間     |
|-------|---|------|----------|
|       | <b>day1</b>                                   |      |          |
|       | アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60～90分前に内服                |      |          |
| ①     | デキサート 9.9mg + アロキシ点滴バッグ0.75mg/50mL            | 点滴静注 | 15分      |
| ②     | エピルビシン( 70～100mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 50mL   | 点滴静注 | 15分      |
| ③     | エンドキサン( 500mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 250mL | 点滴静注 | 30分      |
| ④     | 5-FU( 500mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 50mL        | 点滴静注 | 15分      |
| ⑤     | 生食 50mL                                       | 点滴静注 | ルートフラッシュ |
|       |   |      |          |
|       | <b>day2.3</b>                                 |      |          |
|       | アプレピタント 80mg 内服                               | 経口   |          |
|       | デカドロン錠 8mg/day (1～2回分服)                       | 経口   |          |
|       | <b>day4</b>                                   |      |          |
|       | デカドロン錠 8mg/day (1～2回分服)                       | 経口   |          |
|       |   |      |          |