

がん種	胃		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	Capecitabine+CDDP		点滴投与時間	9h
1コース期間	21days		休薬期間	day16-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day8		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
メイン①	ソルデム1 500mL	点静注	4時間30分
メイン②	ソルデム1 500mL	点静注	4時間30分
側管①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴バッグ	点静注	30分
側管②	アスパラギン酸K注10mEq + 硫酸Mg補正液 8mL + フィジオ140 500 mL	点静注	2時間
側管③	マンニトールS 300mL	点静注	1時間
側管④	ランダ(80mg/m ²) + 生食 500mL (全量500mL)	点静注	2時間
側管⑤	アスパラギン酸K注10mEq + フィジオ140 500 mL	点静注	2時間
	day1夕~15朝		
内服①	カペシタビン(2000mg/m ²)1日2回朝夕食後	経口	
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day4		
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	