

がん種	小細胞肺がん		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	CBDCA+ETP+Atezolizumab		点滴投与時間	day1 4h~3h30m, day2.3 1h50m
1コース期間	21 days		休業期間	day4-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	テセントリク(1200mg/body) + 生食 250mL	点滴静注	60~30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
④	デキサート 4.95mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
⑤	エトポシド(80mg/m ²) + 5%ブドウ糖 500mL	点滴静注	1.5時間
⑥	カルボプラチン(AUC=5) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
⑦	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	day2.3		
①	デキサート 6.6mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	エトポシド(80mg/m ²) + 5%ブドウ糖 500mL	点滴静注	1.5時間
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	day4		
	デカドロン錠 8mg/DAY (1~2回分服)	経口	