

がん種	胃		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	Trastuzumab+Capecitabine+CDDP		点滴投与時間	6h45m~5h45m
1コース期間	21days		休薬期間	day16-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴バッグ	点静注	15分
②	トラスツズマブ(8~6mg/kg) + 生食 250mL	点滴静注	90~30分
③	アスパラギン酸K注10mEq + 硫酸Mg補正液 8mL + ソルデム1 500mL	点静注	1.5時間
④	マンニトールS 300mL	点静注	30分
⑤	ランダ(80mg/m ²) + 生食 500mL (全量500mL)	点静注	1.5時間
⑥	アスパラギン酸K注10mEq + ソルデム1 500mL	点静注	1.5時間
	day1夕~15朝		
内服①	カペシタビン(2000mg/m ²)1日2回朝夕食後	経口	
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day4		
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	