

がん種	大腸		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	Bmab+FOLFIRI		点滴投与時間	day1 3h50m~2h50m
1コース期間	14days		休薬期間	day3-14

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>day1</b>		
	アプレピタント125mg イリノテカン投与60~90分前に内服	経口	
主①	デキサート 4.95mg + グラニセロンバッグ1P	点滴静注	15分
主②	アバスチン( 5or10mg/kg ) + 生食 100mL	点滴静注	90~30分
側②	イリノテカン( 150mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	2時間
主③	レボホリナート( 200mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	2時間
主④	5-FU( 400mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 50mL	急速静注	全開
主⑤	5-FU( 2400mg/m <sup>2</sup> ) + 生食(換算表による)mL (インフューザーポンプまたは微注ポンプ使用)	点滴静注	46時間
	<b>day2.3</b>		
	アプレピタント80mg 内服		
	デカドロン 4mg/day(1~2回分服)		