

がん種	大腸		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	Cmab+FOLFIRI		点滴投与時間	day1 5h50m, day8 2h
1コース期間	14days		休薬期間	day9-14

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>day1</b>		
主①	ポララミン 5mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
主②	デキサート 6.6mg + グラニセトロンバッグ1P	点滴静注	30分
主③	アービタックス( 400mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 250mL(初回のみ500mL)	点滴静注	2時間
主④	生食 50mL	点滴静注	1時間
主⑤	イリノテカン( 150mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	2時間
側⑤	レボホリナート( 200mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	2時間
主⑥	5-FU( 400mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 50mL	急速静注	全開
主⑦	5-FU( 2400mg/m <sup>2</sup> ) + 生食(換算表による)mL (インフューザーポンプまたは微注ポンプ使用)	点滴静注	46時間
	<b>day2.3</b>		
	デカドロン 8mg/day(1~2回分服)		
	<b>day8</b>		
①	ポララミン 5mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	デキサート 6.6mg + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	アービタックス( 250mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
④	生食 50mL	静注	15~30分