

がん種	非小細胞肺がん		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	(squamous) CBDCA+nabPTX+pembrolizumab		点滴投与時間	day1 2h35m, day8.15 50m
1コース期間	21days		休薬期間	day16-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	キイトルーダ(200mg/body) + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
④	デキサート 4.95mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
⑤	アブラキサン(100mg/m ²) + 生食 50mL	点滴静注	30分
⑥	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
⑦	カルボプラチン(AUC=6) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
⑧	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	day8.15		
①	デキサート 6.6mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	アブラキサン(100mg/m ²) + 生食 50mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ