

がん種	睪臓がん		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	mFOLFIRINOX		点滴投与時間	4h15m
1コース期間	14days		休薬期間	day3-14

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>day1</b>		
	アプレピタント125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
メイン①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴バッグ	点滴静注	15分
メイン②	エルプラット ( 85mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	2時間
メイン③	レボホリナート( 200mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	2時間
側管③	イリノテカン( 150mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 250mL	点滴静注	1.5時間
メイン④	5-FU( 2400mg/m <sup>2</sup> ) + 生食(換算表による)mL (インフューザーポンプまたは微注ポンプ使用)	点滴静注	46時間
	<b>day2.3</b>		
	アプレピタント80mg	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	<b>day4</b>		
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	