

がん種	尿路上皮がん		催吐リスク	高度/軽度(催吐性)リスク
レジメン名	GEM+CDDP		点滴投与時間	40m
1コース期間	28days		休業期間	day2-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
①	ソルデム3A 500mL	点滴静注	2時間
②	デキサート 6.6mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
③	ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
④	ソルデム3A 500mL	点滴静注	2時間
	day2		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60～90分前に内服	経口	
メイン①	ソルデム1 500mL	点滴静注	2.5時間
側管①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴バッグ 0.75mg/50mL	点滴静注	30分
側管②	硫酸Mg補正液 8mL + アスパラギン酸K注 10mEq + フィジオ140 500mL	点滴静注	2時間
メイン②	ソルデム1 500mL	点滴静注	2.5時間
側管③	マンニトール 300mL	点滴静注	1時間
側管④	ランダ(70mg/m ²) + 生食 500mL	点滴静注	2時間
メイン③	ソルデム1 500mL	点滴静注	2.5時間
側管⑤	アスパラギン酸K注 10mEq + フィジオ140 500mL	点滴静注	2時間
	day3.4		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1～2回分服)	経口	
	day5		
	デカドロン錠 8mg/day (1～2回分服)	経口	
	day8.15		
①	デキサート 6.6mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ