

がん種	大腸		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	Cmab+Encorafenib+Binimetinib		点滴投与時間	初回day1 :3h50m 2回目以降day1:2h20m
1コース期間	7days		休薬期間	

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>#1 day1</b>		
	生食 20mL フラッシュ	静注	
①	ポララミン 5mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	デキサート 6.6mg + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	アービタックス( 400mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 500mL	点滴静注	2時間
④	生食 50mL	点滴静注	1時間
day1～	ビラフトビカプセル 1日300mg 1日1回	経口	連日
day1～	メクトビ錠 1日90mg 1日2回 朝夕食後	経口	連日
	<b>#2以降 day1</b>		
	生食 20mL フラッシュ	静注	
①	ポララミン 5mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	デキサート 6.6mg + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	アービタックス( 250mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
④	生食 50mL	点滴静注	30分
day1～	ビラフトビカプセル 1日300mg 1日1回	経口	連日
day1～	メクトビ錠 1日90mg 1日2回 朝夕食後	経口	連日