

がん種	非小細胞肺癌		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	(Squamous) CBDCA+GEM+nivolumab		点滴投与時間	day1:1h50m day8: 50m
1コース期間	21 days		休薬期間	day9-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	オプジーボ(360mg/body) + 生食100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
④	デキサート 4.95mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
⑤	ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
⑥	カルボプラチン(AUC=5) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
⑦	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	day8		
①	デキサート 6.6mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ