

がん種	非小細胞肺癌		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	(nonsquamous) CBDCA+PEM+nivolumab+ipilimumab		点滴投与時間	day1:3h10m day22:2h10m
1コース期間	42days		休薬期間	day23-42

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>day1</b>		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	オプジーボ( 360mg/body ) + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	30分
④	ヤーボイ( 1mg/kg ) + 生食20mL	点滴静注	30分
⑤	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
⑥	デキサート 4.95mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
⑦	アリムタ( 500mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 50mL	点滴静注	10分
⑧	カルボプラチン( AUC=5 or 6 ) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
⑨	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	<b>day2.3</b>		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	葉酸: 本剤初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。		

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>day22</b>		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60～90分前に内服		
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	オプジーボ ( 360mg/body ) + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
⑥	デキサート 4.95mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
⑦	アリムタ ( 500mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 50mL	点滴静注	10分
⑧	カルボプラチン ( AUC=5 or 6 ) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
⑨	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	<b>day2.3</b>		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	葉酸: 本剤初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。		

### オプジーボ・ヤーボイ・化学療法併用療法：投与スケジュール

