


がん種	非小細胞肺癌		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	(Squamous) CBDCA+PTX+nivolumab+ipilimumab		点滴投与時間	d1:6h d22:5h
1コース期間	42days		休業期間	day23-42

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	オプジーボ(240mg/body) + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	30分
④	ヤーボイ(1mg/kg) + 生食20mL	点滴静注	30分
⑤	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
⑥	デキサート 19.8mg + ポララミン 5mg + ファモチジン 20mg + アロキシ点滴バッグ	点滴静注	15分
⑦	パクリタキセル(200mg/m ²) + 5%ブドウ糖 500mL	点滴静注	3時間
⑧	カルボプラチン(AUC=6) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
⑨	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	day22		
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	オプジーボ(240mg/body) + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
④	デキサート 19.8mg + ポララミン 5mg + ファモチジン 20mg + アロキシ点滴バッグ	点滴静注	15分
⑤	パクリタキセル(200mg/m ²) + 5%ブドウ糖 500mL	点滴静注	3時間
⑥	カルボプラチン(AUC=6) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
⑦	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	da23.24		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	

オブジーボ・ヤーボイ・化学療法併用療法：投与スケジュール



オブジーボ・ヤーボイ適正使用ガイドより抜粋