

がん種	非小細胞肺癌		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	(Squamous) CDDP+GEM+nivolumab		点滴投与時間	day1: 5h day8: 50m
1コース期間	21 days		休薬期間	day9-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	オプジーボ(360mg/body) + 生食100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
②	ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
③	アスパラギン酸K注 10mEq + 硫酸Mg補正液 8mL + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
④	マンニトールS 300mL	点滴静注	30分
⑤	ランダ(80mg/m ²) + 生食 500mL(全量500mL)	点滴静注	1時間
⑥	アスパラギン酸K注 10mEq + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day4		
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day8		
①	デキサート 6.6mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ