

がん種	子宮頸がん		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	CDGP+CPT-11		点滴投与時間	day1:3h45m day8:1h45m
1コース期間	28days		休薬期間	day9-28

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>day1</b>		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60分～90分前に内服	経口	
主①	ソルアセトF 500mL	点滴静注	2時間
主②	ソルデム3A 500mL	点滴静注	2時間
側①	デキサート9.9mg + アロキシ点滴バッグ	点滴静注	15分
側②	イリノテカン ( 60mg/m <sup>2</sup> ) + 生食500mL	点滴静注	90分
側③	アクブラ ( 80mg / m <sup>2</sup> ) + 生食 500mL	点滴静注	2時間
	<b>day2.3</b>		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン 8mg/day	経口	
	<b>day4</b>		
	デカドロン 8mg/day	経口	
	<b>day8</b>		
主①	ソルデム3A 500mL	点滴静注	2時間
側①	デキサート6.6mg + アロキシ点滴バッグ	点滴静注	15分
側②	イリノテカン ( 60mg/m <sup>2</sup> ) + 生食500mL	点滴静注	90分