

がん種	多発性骨髄腫		催吐リスク	最小度(催吐性)リスク
レジメン名	DMPB		点滴投与時間	約4h
1コース期間			休薬期間	下記スケジュール参照

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	ジフェンヒドラミン50mg、アセトアミノフェン800mg (ダラザレックス投与1~3時間前に内服)	経口	
1	2回目以降 ダラザレックス(16 mg/kg)+ 生食 500mL	点滴静注	50ml/h ~100ml/h ~150ml/h max 200ml/h
2	ベルケイド(1.3mg/m <sup>2</sup> )	皮下注	-
3	プレドニゾン(60mg/m <sup>2</sup> )	経口	
4	デキサメタゾン(20mg/day)	点滴静注 又は経口	15分
	投与スケジュールは下記参照		

## DMPB療法

### 【サイクル1】

6週間1サイクル	1週目							2週目							3週目							
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ダラザレックス	●								●							●					
ボルテゾミブ	●			●				●			●											
メルファラン	◎	◎	◎	◎																		
プレドニゾン		◎	◎	◎																		
デキサメタゾン	●								●							●						

  

6週間1サイクル	4週目							5週目							6週目							
	日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	ダラザレックス	●								●							●					
ボルテゾミブ	●			●				●			●											
メルファラン																						
プレドニゾン																						
デキサメタゾン	●								●							●						

### 【サイクル2～9】

6週間1サイクル	1週目							2週目							3週目							
	日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ダラザレックス	●																				
ボルテゾミブ	●							●														
メルファラン	◎	◎	◎	◎																		
プレドニゾン		◎	◎	◎																		
デキサメタゾン	●																					

  

6週間1サイクル	4週目							5週目							6週目							
	日	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	ダラザレックス	●																				
ボルテゾミブ	●							●														
メルファラン																						
プレドニゾン																						
デキサメタゾン	●																					

### 【サイクル10以降】

4週間1サイクル	1週目		2週目		3週目		4週目	
	日	1	2～7	8～14	15～21	22～28		
	ダラザレックス	●						
デキサメタゾン	●							

※ ◎:内服