

がん種	非小細胞肺癌		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	(non-Squamous) CDDP+PEM+nivolumab+ipilimumab		点滴投与時間	day1: 5h30m day22: 4h30m
1コース期間	42days		休業期間	day23-42

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60~90分前に内服	経口	
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	オプジーボ(360mg/body) + 生食 100mL	点滴静注	30分
③	生食 50mL	点滴静注	30分
④	ヤーポイ(1mg/kg) + 生食20mL	点滴静注	30分
⑤	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
⑥	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴静注用	点滴静注	15分
⑦	アリムタ(500mg/m ²) + 生食 50mL	点滴静注	10分
⑧	アスパラギン酸K注 10mEq + 硫酸Mg補正液 8mL + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
⑨	マンニトールS 300mL	点滴静注	30分
⑩	ランダ(75mg/m ²) + 生食 500mL(全量500mL)	点滴静注	1時間
⑪	アスパラギン酸K注 10mEq + ソルデム1 500mL	点滴静注	1時間
	day2.3		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	day4		
	デカドロン錠 8mg/day (1~2回分服)	経口	
	葉酸: 本剤初回投与の7日以上前から葉酸として1日1回0.5mgを連日経口投与する。なお、本剤の投与を中止又は終了する場合には、本剤最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。		

