

| がん種 | 乳がん | 催吐リスク | 中等度(催吐性)リスク |
|--------|--|--------|--------------------------|
| レジメン名 | GEM+CBDCA+pembrolizumab(q3w) | 点滴投与時間 | day1:2h30m day8:1h50m |
| 1コース期間 | 21 days | 休業期間 | day9-21 |
| 処方No. | 薬品名・用量 | 投与方法 | 注入時間 |
| | day1 | | |
| | アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60～90分前に内服 | 経口 | |
| ① | 生食 50mL | 点滴静注 | ルート確保用 |
| ② | キイトルーダ (200mg/body) + 生食 100mL | 点滴静注 | 30分 |
| ③ | 生食 50mL | 点滴静注 | ルートフラッシュ |
| ④ | デキサート 4.95mg + アロキシ点滴バッグ0.75mg/50mL | 点滴静注 | 15分 |
| ⑤ | ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL | 点滴静注 | 30分 |
| ⑥ | カルボプラチン(AUC=2) + 生食 250mL | 点滴静注 | 1時間 |
| ⑦ | 生食 50mL | 点滴静注 | ルートフラッシュ |
| | | | |
| | day2.3 | | |
| | アプレピタント 80mg 内服 | 経口 | |
| | | | |
| | day8 | | |
| | アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60～90分前に内服 | 経口 | |
| ① | デキサート 4.95mg + アロキシ点滴バッグ0.75mg/50mL | 点滴静注 | 15分 |
| ② | ゲムシタビン(1000mg/m ²) + 5%ブドウ糖 100mL | 点滴静注 | 30分 |
| ③ | カルボプラチン(AUC=2) + 生食 250mL | 点滴静注 | 1時間 |
| ④ | 生食 50mL | 点滴静注 | ルートフラッシュ |
| | | | |
| | day9.10 | | |
| | アプレピタント 80mg 内服 | 経口 | |