

がん種	悪性リンパ腫		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク
レジメン名	Pola-BR		点滴投与時間	
1コース期間	21 days		休薬期間	#1 day4-21 #2~6 day3-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	#1 day1		
	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤 リツキシマブ投与30分前に内服		
①	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②	リツキシマブ ($375\text{mg}/\text{m}^2$) + 生食500mL	点滴静注	
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	#1 day2		
	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、アプレピタント 125mg ポライビー投与30分前に内服		
①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴静注	点滴静注	30分
②	ポライビー ($1.8\text{mg}/\text{kg}$) + 生食 100mL	点滴静注	90~30分
③	生食 50mL	点滴静注	30分
④	トレアキシシ ($90\text{mg}/\text{m}^2$) + 生食250mL	点滴静注	1時間
⑤	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	#1 day3		
①	デキサート 9.9mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	トレアキシシ ($90\text{mg}/\text{m}^2$) + 生食250mL	点滴静注	1時間
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	アプレピタント 内服 80mg	内服	
	#1 day4		
	アプレピタント 内服 80mg	内服	
	#1 day5		
	ジーラスタ 皮下注		

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	#2~6 day1		
	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤、アプレピタント 125mg ポライビー投与30分前に内服		
①	デキサート 9.9mg + アロキシ点滴バッグ 0.75mg/50mL	点滴静注	30分
②	リツキシマブ (375mg/m ²) + 生食 500mL	点滴静注	
③	生食 50mL	点滴静注	30分
④	ポライビー (1.8mg/kg) + 生食 100mL	点滴静注	90分~30分
⑤	生食 50mL	点滴静注	30分
⑥	トレアキシシ (90mg/m ²) + 生食 250mL	点滴静注	1時間
⑦	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	#2~6 day2		
①	デキサート9.9mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
②	トレアキシシ (90mg/m ²) + 生食250mL	点滴静注	1時間
③	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
	アプレピタント 80mg 内服	内服	
	day3		
	アプレピタント 80mg 内服	内服	
	day4		
	ジーラスタ 皮下注		