

がん種	胚細胞腫瘍		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	BEP (short hydration)		点滴投与時間	day1～5は入院で実施 day8、15:1h
1コース期間	21 days (28days)		休業期間	day16-21 or 28

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	day1 (入院)		
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60分～90分前に内服	経口	
メイン①	ソルデム3A 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL	点滴静注	2時間
メイン②、③	ソルデム3A 500mL × 2本	点滴静注	4時間
側①	アロキシ点滴バッグ0.75mg/50mL + デキサート9.9mg	点滴静注	15分
側②	ブレオ (20mg/m ² ※最大30mg/回) + 生食100mL	点滴静注	30分
側③	エトポシド (100mg/m ²) + 生食 500mL	点滴静注	2時間
側④	ランダ (20mg/m ²) + 生食 500mL (全量500mL)	点滴静注	2時間
側⑤	マンニトールS 300mL	点滴静注	30分
	day2.3.4.5 (入院)		
	アプレピタント 80mg 内服	経口	
メイン①	ソルデム3A 500mL + 硫酸Mg補正液 8mL	点滴静注	2時間
メイン②、③	ソルデム3A 500mL × 2本	点滴静注	4時間
側①	デキサート 9.9mg + 生食 50mL	点滴静注	15分
側②	エトポシド (100mg/m ²) + 生食 500mL	点滴静注	2時間
側③	ランダ (20mg/m ²) + 生食 500mL (全量500mL)	点滴静注	2時間
側④	マンニトールS 300mL	点滴静注	30分
	day8、15 (外来で実施可)		
メイン①	SD3A 200mL	点滴静注	1時間
側①	ブレオ (20mg/m ² ※最大30mg/回) + 生食100mL	点滴静注	30分