

レジメナー覧				2023.2.8	
がん種	乳がん		催吐リスク	中等度(催吐性)リスク	
レジメン名	【術前】 CBDCA+wPTX+pembrolizumab		点滴投与時間	day1:3h day8.15:1h20m	
1コース期間	21days		休薬期間	day16-21	
総コース数	4サイクル				
処方No.	薬品名・用量			投与方法	注入時間
	day1				
	アプレピタント 125mg 抗がん剤投与60～90分前に内服			経口	
①	生食 50mL			点滴静注	ルート確保用
②	キイトルーダ (200mg/body) + 生食 100mL			点滴静注	30分
③	生食 50mL			点滴静注	ルートフラッシュ
④	デキサート 4.95mg + ポラミン注5mg + ファモチジン20mg + アロキシ点滴バッグ 0.75mg/50mL			点滴静注	15分
⑤	パクリタキセル(80mg/m ²) + 生食 250mL			点滴静注	1時間
⑥	カルボプラチン(AUC=5) + 生食 250mL			点滴静注	1時間
⑦	生食 50mL			点滴静注	ルートフラッシュ
	day2.3				
	アプレピタント 80mg 内服			経口	
	day8.15				
①	ファモチジン注 20mg + デキサート 8.25mg + ポラミン 5mg + 生食 50mL			点滴静注	15分
②	パクリタキセル(80mg/m ²) + 生食 250mL			点滴静注	1時間
④	生食 50mL			点滴静注	ルートフラッシュ