

レジメー一覧

がん種	胆道がん		催吐リスク	高度(催吐性)リスク
レジメン名	Durvalumab+GEM+CDDP		点滴投与時間	day1: 6h10m day8: 5h
1コース期間	21 days		休業期間	day9-21

処方No.	薬品名・用量	投与方法	注入時間
	<b>day1.8</b>		
	アプレピタント 125mg ゲムシタビン投与60～90分前に内服	経口	
①(day1のみ)	生食 50mL	点滴静注	ルート確保用
②(day1のみ)	イミフィンジ( 1500mg/body ) + 生食 250mL	点滴静注	60分
③(day1のみ)	生食 50mL	点滴静注	ルートフラッシュ
メイン①～③	ソルデム3A 500mL × 3	点滴静注	300mL/h
側管①	デキサート 9.9mg +アロキシ点滴バッグ 0.75mg/50mL	点滴静注	15分
側管②	ランダ( 25mg/m <sup>2</sup> ) + 生食 250mL (全量250mLとなるよう薬剤科にて生食の量を調節)	点滴静注	1時間
側管③	ゲムシタビン( 1000mg/m <sup>2</sup> ) + 5%ブドウ糖 100mL	点滴静注	30分
側管④	マンニトール 300mL	点滴静注	1時間
側管⑤	ラシックス 20mg + 生食 50mL	点滴静注	5分 (メイン終了直前)
	<b>day2.3.9.10</b>		
	アプレピタント 80mg 内服		
	デカドロン8mg/day(1～2回分服)		
	<b>day4.11</b>		
	デカドロン8mg/day(1～2回分服)		